

# ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

## МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо застосування засобу «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)»  
з метою дезінфекції рук, шкіри, невеликих за площею поверхонь та  
некритичних медичних виробів

Київ – 2014

Організація – розробник: ДЗ «Центральна санепідстанція МОЗ України» за участю ТОВ «Бланідас» (Україна).

Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції.

Місцевим закладам охорони здоров'я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у необхідній кількості примірників.

ПОГОДЖЕНО



С. В. Протас  
2014 р.

## МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо застосування засобу «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)»  
з метою дезінфекції рук, шкіри, невеликих за площею поверхонь та  
некритичних медичних виробів

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу – засіб дезінфікуючий «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)», за ТУ У 24.2-36257034-004:2009.

1.2. Фірма виробник – ТОВ «Бланідас», Україна.

1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: пропанол-1 (спирт пропіловий) – 40,0%, пропанол-2 (спирт ізопропіловий) – 35,0%, алкілдиметилбензиламоніум хлорид - 0,15% (діючі речовини); комплекс догляду за шкірою, запашка, дистильована вода до 100%.

1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» випускається у вигляді готової до застосування рідини з характерним запахом спирту, pH складає  $5,5 \pm 1,5\%$ . Не містить барвників. Комплекс догляду за шкірою захищає руки та шкіру від сухості і подразнень, зберігає еластичність і природний водно-жировий баланс шкіри. В залежності від функціонального призначення засіб випускається в 5 модифікаціях – прозорий, рожевий, блакитний, зелений, жовтий.

1.5. Призначення засобу. «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» призначений:

- для дезінфекції (антисептики) рук медичного персоналу закладів охорони здоров'я (в тому числі для гігієнічної та хірургічної обробки рук медичного і обслуговуючого персоналу закладів охорони здоров'я усіх профілів, у тому числі дитячих стаціонарів, стоматологічних клінік, акушерсько-гінекологічних клінік, пологових будинків, відділень неонатології, палат, блоків і відділень реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, педіатричних віддіlenь, відділень хірургічного профілю, маніпуляційних, перев'язувальних кабінетах, операційних, фізіотерапевтичних, патолого-анatomічних та інших відділень, амбулаторій, поліклінік, клінік пластичної хірургії і т.ін.; для дезінфекції рук хірургів і членів хірургічної бригади, операційних медичних сестер, акушерок та інших осіб, які приймають участь у проведенні операцій, прийомі пологів тощо).

- для антисептичної обробки шкіри пацієнта (обробка операційного, ін'екційного поля, при проведенні інвазивних медичних втручань, щеплень, при установці внутрішньосудинних пристрій (наприклад, центрального венозного катетера), катетерів для спинальної або епідуральної анестезії, при проведенні внутрішньовенених, внутрішньом'язових, внутрішньошкірних, підшкірних маніпуляцій, при проведенні пункції органів, суглобів та спинномозкового каналу, при малих хірургічних втручаннях і т.ін., в тому числі для антисептичної обробки шкіри новонароджених і дітей при проведенні всіх видів маніпуляцій), для антисептичної обробки ліктів згинів донорів, для обробки дрібних ушкоджень шкіри тощо. Нанесення засобу на скаріфіковану шкіру не ускладнює загоєння штучно нанесених ран.

- для гігієнічної дезінфекції (антисептики) рук персоналу лабораторій різних підпорядкувань (клініко-діагностичних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних тощо), санітарного транспорту (у т.ч. машин швидкої медичної допомоги), у донорських пунктах та

пунктах переливання крові, медико-санітарних частинах, фельдшерсько-акушерських та медичних пунктах;

- для гігієнічної дезінфекції (антисептики) рук персоналу об'єктів комунально- побутового обслуговування (перукарень, салонів краси, SPA-центрів, манікюрних, педікюрних, масажних кабінетів, косметологічних клінік, салонів, солярій, лазень, саун тощо) до і після роботи з клієнтом, а також для обробки шкіри клієнта при манікюрі, педикюрі, татуажі, пірсингі та інших процедурах, пов'язаних із пошкодженням шкіри; для дезінфекції (санітарної обробки) шкірних покривів, обробки шкіри ніг з метою профілактики грибкових та ін. інфекцій;

- для гігієнічної дезінфекції (антисептики) і деконтамінації шкіри рук персоналу харчопереробної промисловості (пекарні, кондитерські фабрики, молокозаводи, м'ясопереробні заводи, по виробництву пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод та ін.), підприємств і закладів агропромислового комплексу (молокотоварні ферми, птахофабрики тощо), парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості; для дезінфекції (антисептики) рук персоналу та відвідувачів закладів громадського харчування і торгівлі (ідалні, ресторани, ресторани швидкого харчування, магазини, супермаркети, ринки тощо);

- для гігієнічної дезінфекції (антисептики) рук та антисептичної обробки шкіри у домашніх умовах при догляді за хворими, немовлятами, людьми похилого віку, в подорожах, у місцях підвищеної інфекційної небезпеки.

- для гігієнічної дезінфекції (антисептики) рук персоналу та дітей дитячих дошкільних закладів, персоналу та учнів учебних закладів різних рівнів акредитації, працівників дезінфекційної, санітарно-епідеміологічної і ветеринарної служб, аптек і аптечних закладів, санаторно-курортних, спортивно-оздоровчих закладів різноманітного профілю, закладів соціального захисту (будинків престарілих, інвалідів), закладів зв'язку та банківських установах; для дезінфекції (антисептики) рук персоналу та пасажирів всіх видів транспорту (в т.ч. залізничного транспорту (в пасажирських вагонах та ін. об'єктах рухомого складу, на залізничних вокзалах та станціях) і авіатранспорту), об'єктів і підрозділів міністерств внутрішніх справ та оборони, в установах пенітенціарної системи, співробітників митниці і прикордонних служб та інших об'єктів, діяльність яких вимагає додержання санітарно-гігієнічних норм та правил;

- для швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь, виробів медичного призначення, у тому числі інструментів, рукавичок та інших невеликих за розмірами об'єктів в екстрених (ургентних) ситуаціях.

**«АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» помаранчевий** призначений для:

- обробки та маркування операційного поля та швів пацієнта, ліктьових згинів донорів на станціях переливання крові, для обробки та маркування шкіри при постановці внутрішньо судинних пристройів (центральний венозний катетер), катетерів для спинальної або епідуральної анестезії, при пункціях суглобів у закладах охорони здоров'я.

#### **1.6. Специфічні біологічні властивості засобу: спектр антимікробної дії.**

«АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» має антимікробну активність у відношенні грампозитивних і грамнегативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарніх інфекцій, мікобактерії туберкульозу, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (*Escherichia coli*), синьогнійну паличку (*Ps. Aeruginosa*), сальмонели та інші антибіотикорезистентні бактерії), вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (B, C), вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліома-, поліо-, норо-, рота-, енtero-, вакцинія віруси, SARS, віруси герпесу, віруси грипу, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1) та ін.), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій).

Засіб високоефективний проти транзиторної і резидентної мікрофлори, чим забезпечує якісну гігієнічну і хірургічну антисептику рук і шкіри. Засіб проявляє високоякісну дію в присутності білка, сироватки, крові. Засіб забезпечує антиперспірантну дію, зменшує кількість вологи під рукавичками, що перешкоджає виділенню резидентної мікрофлори. Засіб «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» володіє пролонгованою (реманентною, залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин (у т.ч. під медичними рукавичками).

Засіб забезпечує знежирююче очищення шкіри, сприяє ефективному прилипанню хірургічної плівки.

**1.7. Токсичність та безпечність засобу.** «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» за параметрами гострої токсичності належить до малонебезпечних речовин (відповідно до вимог ГОСТ 12.01.007-76) при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру (4-й клас). Не виявляє шкірно-подразнюючих та сенсибілізуючих властивостей при одно- та багаторазовому нанесенні на шкіру. Нанесення засобу на скарифіковану шкіру не ускладнює загоєння штучно нанесених ран. Засіб не виявляє кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, етіотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних).

## **2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ**

**2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів.** «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» – це готовий до застосування засіб, який використовують одноразово нерозведеним.

## **3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ**

**3.1. Об'єкти застосування.** Засіб «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» використовують для гігієнічної та хірургічної дезінфекції (антисептики) рук медичного і обслуговуючого персоналу лікувально-профілактичних закладів усіх профілів, для антисептичної обробки шкіри пацієнтів і клієнтів, для дезінфекції ліктьових згинів донорів, для швидкої дезінфекції поверхонь, виробів медичного призначення, у тому числі некритичних інструментів, рукавичок та інших невеликих за розмірами об'єктів, для гігієнічної дезінфекції рук та шкіри у домашніх умовах, для дезінфекції (санітарної обробки) шкірних покривів, обробки шкіри ніг з метою профілактики грибкових та ін. інфекцій, для гігієнічної дезінфекції та деконтамінації рук персоналу різних сфер діяльності, зазначених в п.1.5.

### **3.2. Методи знезараження об'єктів засобом.**

**3.2.1. Гігієнічна дезінфекція (антисептика) і деконтамінація рук** спрямована проти набутої патогенної мікрофлори (транзиторна флора). З метою переривання ланцюга передачі збудників інфекційних захворювань гігієнічну дезінфекцію (деконтамінацію) рекомендується проводити перед миттям рук. Для точного гігієнічного дозування засобу і уникнення ризику перехресного інфікування рекомендується використовувати настінні ліктьові дозатори, медфікси або настінні прямачі.

Перед проведенням маніпуляцій – на сухі руки нанести 3 мл засобу «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» та втирати протягом 15 секунд.

#### Після виконання маніпуляцій:

у випадку, коли руки незабруднені - на сухі руки нанести 3 мл засобу «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» та втирати протягом 15 секунд;

у випадку, коли руки забруднені - забруднення на руках видалити за допомогою одноразової серветки «АХД 2000® експрес серветки (AHD 2000® express wipes)», а потім провести обробку рук, втираючи 3 мл «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» протягом 15 секунд.

Під час проведення гігієнічної дезінфекції (деконтамінації) рук слід дотримуватися техніки обробки рук. Після дезінфекції руки не миють, не втирають і не висушують.

**3.2.2. Хірургічна дезінфекція (антисептика) рук** спрямована проти набутої патогенної мікрофлори (транзиторна флора) і проти звичайних для шкіри мікробів (резидентна флора). Перед використання засобу необхідно вимити руки і передпліччя з використанням рідкого мила, насухо витерти їх за допомогою одноразового паперового рушника (серветки). На сухі чисті руки і передпліччя за допомогою ліктьового дозуючого пристрою нанести порціями 5-10 мл засобу «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)», втирати засіб протягом 1 хвилини за технікою хірургічної обробки рук, підтримуючи шкіру зволоженою засобом протягом усього часу обробки. Перед надяганням рукавичок дочекатися повного висихання шкіри.

**3.2.3. Дезінфекція (антисептична обробка, маркування) шкіри пацієнта (клієнта)** полягає в тому, що поверхня шкіри, яка потребує обробки, повністю змочується засобом. Час експозиції становить не менше 15 секунд, якщо шкіра багата на сальні залози – не менше 10 хв.

**3.2.4. Санітарна обробка шкірних покривів, профілактична обробка шкіри ніг з метою профілактики грибкових та ін. інфекцій** проводиться шляхом нанесення на шкіру засобу «АХД

**2000®** експрес (AHD 2000® express)» в кількості не менше 3 мл (залежно від розміру поверхні шкіри, яка обробляється). Час експозиції становить не менше 15 секунд. Після обробки шкіру не ваніль, не витирають і не висушують.

**3.2.5. Швидка дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення, у тому числі некритичних інструментів, рукавичок та інших невеликих за розмірами об'єктів в екстрених (ургентних) ситуаціях** проводиться методом протирання або зрошення (за наявності розпилювача) об'єктів засобом «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)», підтримуючи поверхню (виріб, інструмент тощо) заложеною протягом 15 секунд. Норма витрат засобу не повинна перевищувати 30 мл/м<sup>2</sup>. Після завершення часу експозиції змивати засіб не обов'язково.

## 4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

**4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання, очей при роботі із засобом.** Не потрібує засобів захисту шкіри, органів дихання та очей.

**4.2. Загальні застережні заходи при роботі із засобом.** Засіб «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» призначений тільки для зовнішнього застосування. Не використовувати для обробки слизових оболонок, не допускати потрапляння засобу в очі. Засіб небезпечний при проковтуванні, тому треба уникати його потрапляння до шлунку. Засіб є пожежонебезпечним, забороняється виконувати роботи із дезінфекції у приміщеннях за наявності джерел відкритого вогню та тепла. При випадковому розливанні великої кількості засобу забезпечують інтенсивне провітрювання приміщення. Пролитий засіб збирають піском або іншим негорючим матеріалом, що добре поглинає рідину. Очищену поверхню промивають водою.

**4.3. Методи утилізації.** Партиї «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» з вичерпанням терміном придатності або некондиційні партії засобу внаслідок порушення умов зберігання підлягають поверненню на підприємство-виробник для переробки.

## 5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

**5.1. Ознаки гострого отруєння.** Не відмічено.

**5.2. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні засобом.** Немає.

**5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі.** Промити очі великою кількістю проточеної води. За необхідності звернутися до лікаря.

**5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу у шлунок.** Рекомендується прополоскати ротову порожнину водою і випити велику кількість води. Не викликати блювоту! У разі необхідності звернутися до лікаря.

## 6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

**6.1. Пакування засобу.** Засіб «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» упаковують в поліетиленові флакони від 30 мл до 1000 мл (з розпилювачем або без), у каністри від 5 л до 30 л, у сошетки від 3 мл до 30 мл. За домовленістю з виробником асортимент пакування може бути змінений або доповнений.

**6.2. Умови транспортування.** Транспортування засобу здійснюють в упаковці виробника усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів.

**6.3. Термін та умови зберігання.** Засіб «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» зберігають в герметичному пакуванні виробника при температурі від +5°C до +30°C у критих неопалювальних складських приміщеннях, захищених від вологи та прямого сонячного світла, остеронь від джерел відкритого вогню і тепла, окрім від легкозаймистих матеріалів і речовин, в недоступних для дітей місцях. Приміщення для зберігання засобу повинні бути забезпечені одним із засобів пожежогасіння. Термін придатності засобу - 3 роки з дати виготовлення.

## **7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ**

### **7.1. Контролюючі показники і норми.**

Дезінфікуючий засіб «АХД 2000® експрес (AHD 2000® express)» контролюється за наступними показниками якості: зовнішній вигляд, колір, запах, водневий показник (рН), масова частка н-пропилового, ізопропилового спиртів і алкілдиметилбензиламонію хлориду.

### **7.2. Визначення зовнішнього вигляду, кольору і запаху.**

В залежності від використаної сировини (барвника) та функціонального призначення засіб випускається в 5 модифікаціях – прозорий, рожевий, блакитний, зелений, жовтий.

Зовнішній вигляд і колір засобу визначають візуально. Для цього в пробірку із безколірового скла з внутрішнім діаметром 30-32 мм наливають засіб до половини і продивляються в приходящому світлі. Пробірку ставлять на білий папір.

Запах оцінюють органолептичним методом.

### **7.3. Визначення водневого показника (рН) засобу.**

Показник концентрації водневих іонів (рН) визначають потенціометричним методом в відповідності з ГФ XI, вип. 1, стор.113 «Визначення рН».

### **7.4. Визначення масової частки ізопропилового спирту і н-пропилового спирту.**

#### **7.4.1. Устаткування, реактиви.**

Хроматограф лабораторний газовий з пламенно - іонізаційним детектором.

Колонка хроматографічна, металева довжиною 100 см і внутрішнім діаметром 0,3 см.

Сорбент-полісорб-1 з розміром часток 0,1-0,3 мм. за ТУ 6-09-10-1834-88.

Ваги лабораторні загального призначення 2 класу точності за ГОСТ 24104-88 з найбільшою межею важення 200 г.

Макрошприць типу МШ-1.

Азот газоподібний, технічний за ГОСТ 9293-74, зжатий в балоні.

Водень технічний в балоні за ГОСТ 17433-88, зжатий в балоні або із генератора водню системи СГС-2.

Повітря, зжате в балоні за ГОСТ 17433-80 або із компресора.

Секундомір за ТУ 25-1894,003-90.

Пропанол-1 для хроматографії за ТУ 6-09-783-76. аналітичний стандарт.

Пропанол-2 для хроматографії за ТУ 6-09-4522-77. аналітичний стандарт.

#### **7.4.2. Підготовка до виконання вимірювань.**

Монтаж, налагодження і вивід хроматографа на робочий режим проводять в відношенні з інструкцією, доданої до приладу.

#### **7.4.3. Умови хроматографування.**

Швидкість газу-носія	30 см <sup>3</sup> /хв.
Швидкість водню	20 см <sup>3</sup> /хв.
Швидкість повітря	300±100 см <sup>3</sup> /хв.
Температура термостату колонки	135°C
Температура детектора	150°C
Температура випарника	200 °C
Об'єм введеної проби	0,3 мкл
Швидкість руху діаграмної стрічки	200 мм/год
Час утримування ізопропилового спирту	~4 хв.
Час утримування н-пропилового спирту	~6 хв.

Коефіцієнт атенюювання підбирають таким чином, щоб висота хроматографічних піків становила 40%-60% від шкали діаграмної стрічки.

#### **7.4.4. Приготування градуйованого розчину.**

З точністю до 0.0002 г. зважують аналітичні стандарти ізопропилового, н-пропилового спиртів і дистильовану воду в кількостях, необхідних для отримання розчинів з концентрацією вказаних спиртів біля 40% і 25% відповідно. Відмічають величину наважок і розраховують точний вміст спиртів в масових відсотках.

#### *7.4.5. Виконання аналізу.*

Градуйований розчин і аналізуючий засіб хроматографують не менше 3 разів кожний і розраховують площу хроматографічних піків.

#### *7.4.6. Обробка результатів*

Масові частки ізопропилового і н-пропилового спиртів (X) в відсотках вираховують за формулою:

$$X = \frac{C_m \times S_x}{S_m},$$

де  $C_m$  - вміст визначуваного спирту в градуйованому розчині, %

$S_x$  - площа піку визначуваного спирту на хроматограмі випробуваного засобу;

$S_m$  - площа піку визначуваного спирту на хроматограмі стандартного розчину.

За результат приймають середнє арифметичне значення із двох паралельних визначень, абсолютне розходження між якими не перевищує допустимого розходження 0,005%.

У випадку перевищення, аналіз повторюють і за результат приймають середнє арифметичне значення всіх вимірювань. Допустима відносна сумарна погрішність результату аналізу  $\pm 6,0\%$  для довірчої ймовірності 0,95.

#### *7.5. Визначення масової частки алкілдиметилбензиламонію хлориду.*

Методика основана на методі двофазного титрування. Алкілдиметилбензиламоній хлорид титрують за допомогою аніонного стандартного розчину (натрій лаурилсульфат) при додаванні індикатора із аніонного фарбуючого засобу (метиленовий голубий).

Титрування проводиться в двофазній системі (вода і хлороформ).

##### *7.5.1. Устаткування, матеріали, реактиви:*

ваги лабораторні загального призначення 2 класу за ГОСТ 24104 з найбільшою шкалою важення 200 г;

циліндр лабораторний, скляний, мірний з притерткою пробкою за ГОСТ 1770, місткістю 100 см<sup>3</sup>;

колби лабораторні, скляні, мірні за ГОСТ 1770, місткістю 100 і 1000 см<sup>3</sup>;

бюретка за ГОСТ 29169 місткістю 10 см<sup>3</sup>;

піпетка за ГОСТ 29169 місткістю 1,0 і 2,0 см<sup>3</sup>;

натрій лаурилсульфат з масовою часткою основного засобу не менше 98%;

метиленовий голубий (індикатор) за ТУ 6-09-29, ч.д.а;

хлороформ за ГОСТ 20015, ч.д.а;

кислота сірна за ГОСТ 4204, ч.д.а;

вода де мінералізована або дистильована за ГОСТ 6709.

##### *7.5.2. Підготовка до аналізу*

###### *7.5.2.1. Приготування 0,0015 М розчину натрію лаурилсульфату:*

0,441 г. натрію лаурилсульфату зваженого до четвертого десятинного знаку, розчиняють у воді і кількість переносять в мірну колбу місткістю 1000 см<sup>3</sup> і доводять об'єм до каліброваної мітки при температурі 20 °C.

###### *7.5.2.2. Приготування розчину індикатора метиленового блакитного:*

0,1 г. індикатора, зваженого на аналітичних вагах з погрішністю не більше 0,002 г., розчиняють у воді і кількість переносять в мірну колбу місткістю 100 см<sup>3</sup>, доводять об'єм рідини до каліброваної мітки при температурі 20 °C і ретельного перемішують.

###### *7.5.3. Проведення аналізу:*

В мірний циліндр з притерткою пробкою місткістю 100 см<sup>3</sup> поміщують біля 2 г. розчину зваженого з точністю до четвертого десятинного знаку, і розбавляють водою до 50 см<sup>3</sup>. Потім доливають 0,5 см<sup>3</sup> 5Н розчину сірної кислоти, 2 см<sup>3</sup> розчину індикатора метиленового блакитного. 10 см<sup>3</sup> хлороформу і титрують стандартним розчином натрію лаурилсульфату, доливаючи його порціями по 0,2 см<sup>3</sup> за допомогою бюретки, кожний раз екстрагуючи виниклий іонний асоціат. Для цього після кожного доливання титрату, циліндр плавно перевертають пробкою вверх-вниз 5-6 разів. Точку еквівалентності визначають по кінцевому переходу синьо - фіолетового фарбування в нижній хлороформний шар і обезбарвленню верхнього шару.

###### *7.5.4. Опрацювання результатів:*

Масову частку алкілдиметилбензиламонію хлориду (X%) вираховують по формулі:

$$X = \frac{0.0005093 \times V \times 100}{m},$$

де 0,0005093 - середня маса алкілдиметилбензиламонію хлориду, співпадає 1 см<sup>3</sup>  
0,0015 М розчину натрію лаурилсульфату;

V – об’єм титрату – 0,0015 М розчину натрію лаурилсульфату, см<sup>3</sup>;

M – маса проби, г.

За результат приймають середнє арифметичне значення із двох паралельних визначень, абсолютне розходження між якими, не перевищує допустимого розходження 0,0005%.

В випадку перевищення аналіз повторюють і за результат приймають середнє арифметичне значення всіх вимірювань. Допустима відносна сумарна погрішність результату аналізу ±6,0% для довірчої ймовірності 0,95.

Прочесувано  
та проченено  
з архівів  
Дирекції  
ДОВ "Біорнігас"  
Краско О.О.

